

# ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

## 6<sup>η</sup> ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

### Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ



Κυριακή, 16 Μαΐου, 2010

Ώρα: 10:00 – 12:30


#### Οδηγίες:

- 1) Το δοκίμιο αποτελείται από έντεκα (11) θέματα.
- 2) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.
- 3) Επιτρέπεται η χρήση μόνο μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής.
- 4) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού.
- 5) Να γράφετε μόνο με μελάνι χρώματος μπλε ή μαύρου.

#### ΘΕΜΑ 1 (4 μονάδες)


Ένας μαθητής τοποθέτησε πάνω σε ένα ποτήρι ένα χαρτόνι και πάνω σε αυτό ένα νόμισμα. Στη συνέχεια τράβηξε σιγά-σιγά το χαρτόνι και παρατήρησε ότι το νόμισμα κινείται μαζί με το χαρτόνι. Επανέλαβε το πείραμα αλλά αυτή τη φορά, ο μαθητής τραβά απότομα το χαρτόνι, οπότε παρατήρησε ότι το νόμισμα πέφτει μέσα στο ποτήρι.

Να εξηγήσετε τις πιο πάνω παρατηρήσεις, κάνοντας αναφορά στην αρχή της Φυσικής που σχετίζονται.



#### ΘΕΜΑ 2 (4 μονάδες)

Ένα φορτηγό αυτοκίνητο και ένα mini cooper, πολύ μικρότερης μάζας από το φορτηγό, συγκρούονται μετωπικά.




(α) Να εξηγήσετε, κάνοντας αναφορά στο σχετικό νόμο της Φυσικής, κατά πόσο το mini cooper θα δεχτεί από το φορτηγό, κατά την κρούση, δύναμη ίσου, μεγαλύτερου ή μικρότερου μέτρου, σε σχέση με το μέτρο της δύναμης που θα δεχτεί το φορτηγό από το mini cooper.

(β) Να εξηγήσετε, κάνοντας αναφορά στο σχετικό νόμο της Φυσικής, ποιο από τα δύο οχήματα, θα δεχτεί, κατά τη διάρκεια της κρούσης, τη μεγαλύτερη κατά μέτρο επιτάχυνση.

**ΘΕΜΑ 3 (4 μονάδες)**

Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται στο μεγάλο έμβολο ενός υδραυλικού πιεστηρίου που έχει εμβαδό επιφάνειας  $S_2=22m^2$ . Το αυτοκίνητο αρχίζει να ανυψώνεται μόλις ασκήσουμε δύναμη  $F_1=100N$  στο μικρό έμβολο, που έχει εμβαδό επιφάνειας  $S_1=0,2m^2$ .




Να υπολογίσετε:

- (α) Την πίεση  $P_1$  που ασκείται στο μικρό έμβολο.
- (β) Το βάρος του αυτοκινήτου.

**ΘΕΜΑ 4 (4 μονάδες)**

Το σχήμα 1 δείχνει ένα υδραυλικό πιεστήριο και το σχήμα 2 ένα δίκτυο ύδρευσης.




Να διατυπώσετε την αρχή της φυσικής η οποία εφαρμόζεται:

- (α) Στη λειτουργία του υδραυλικού πιεστηρίου και
- (β) Στο δίκτυο ύδρευσης.

**ΘΕΜΑ 5 (7 μονάδες)**

Στο διάγραμμα φαίνονται έξι στιγμιότυπα της κίνησης μιας μπάλας που κινείται οριζόντια, προς τα δεξιά, κατά μήκος μιας ευθύγραμμης αυλακωτής τροχιάς, με σταθερή ταχύτητα. Το χρονικό διάστημα δύο διαδοχικών στιγμιότυπων είναι σταθερό, ίσο με 2s. Το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών στιγμιότυπων είναι σταθερό, ίσο με 10cm.




**Θέσεις της μπάλας σε κάθε δύο δευτερόλεπτα**

- (α) Να εξηγήσετε πόσο είναι το μέτρο της συνισταμένης δύναμης στην μπάλα.
- (β) Να προσδιορίσετε το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε η μπάλα να κινηθεί από το στιγμιότυπο 1 στο στιγμιότυπο 6.
- (γ) Να χαράξετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της μετατόπισης  $\Delta x$  της μπάλας σε σχέση με το χρόνο  $t$ , από το πρώτο μέχρι το έκτο στιγμιότυπο. (Θεωρήστε  $t=0$ , τη χρονική στιγμή για το 1<sup>ον</sup> στιγμιότυπο).

**ΘΕΜΑ 6 (9 μονάδες)**

Στο σχήμα φαίνεται ένα μήλο, μάζας  $140\text{g}$ , που συγκρατείται (είναι ακίνητο) από ένα κλαδί.  
(Δίνεται:  $g=10\text{m/s}^2$ ).



- (α) Να εξηγήσετε πόση είναι η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο μήλο.
- (β) Να προσδιορίσετε το μέτρο και τη φορά της δύναμης που ασκεί το κλαδί πάνω στο μήλο. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
- (γ) Τη χρονική στιγμή  $t=0$ , το μήλο ελευθερώνεται από το κλαδί και πέφτει προς το έδαφος. Τη χρονική στιγμή  $t=0,4\text{s}$  το μήλο απέχει από το έδαφος  $0,7\text{m}$ .
- (ι) Να εξηγήσετε με ποια επιτάχυνση πέφτει το μήλο προς το έδαφος. ( $H$  αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα).
- (ii) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του μήλου, τη στιγμή  $t=0,4\text{s}$ .
- (iii) Να υπολογίσετε το αρχικό ύψος  $H$  του μήλου από το έδαφος (βλέπε σχήμα).

**ΘΕΜΑ 7 (10 μονάδες)**

Ένα αυτοκίνητο μάζας  $1200\text{kg}$  (μαζί με τον οδηγό) βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο. Τη χρονική στιγμή  $t_0=0$ , και για τα τέσσερα πρώτα δευτερόλεπτα, ο οδηγός επιταχύνει το αυτοκίνητο με σταθερή επιτάχυνση, α. Στο τέλος των τεσσάρων πρώτων δευτερολέπτων το αυτοκίνητο αποκτά ταχύτητα μέτρου  $10\text{m/s}$ . Αμέσως μετά το τέταρτο δευτερόλεπτο και μέχρι το τέλος του δέκατου δευτερολέπτου, η συνισταμένη δύναμη στο αυτοκίνητο είναι μηδέν.



- (α) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του αυτοκινήτου, για τα τέσσερα πρώτα δευτερόλεπτα.
- (β) Να υπολογίσετε την συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης.
- (γ) Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε σχέση με το χρόνο, από τη στιγμή  $t_0=0$  μέχρι τη στιγμή  $t_1=10\text{s}$ .
- (δ) Να υπολογίσετε το διάστημα που καλύπτει το αυτοκίνητο από τη στιγμή  $t_0=0$  μέχρι τη στιγμή  $t_1=10\text{s}$ .

**ΘΕΜΑ 8 (11 μονάδες)**

Ένα δοχείο είναι γεμάτο με λάδι πυκνότητας  $800\text{kg/m}^3$  και έχει ύψος  $0,3\text{m}$ . Το εμβαδόν της βάσης του δοχείου είναι  $0,02\text{m}^2$ .

(Δίνεται:  $g=10\text{m/s}^2$ ).

λάδι

Να υπολογίσετε:

- (α) Την υδροστατική πίεση σε σημείο που βρίσκεται σε ύψος  $0,1\text{m}$  από τον πυθμένα του δοχείου.
- (β) Το μέτρο της δύναμης που δέχεται ο πυθμένας του δοχείου από το λάδι.
- (γ) Αδειάζουμε τώρα ολόκληρη την ποσότητα του λαδιού σε ένα δεύτερο δοχείο που έχει διπλάσιο εμβαδόν βάσης από το πρώτο δοχείο.
- Να εξηγήσετε αν θα άλλαζε και πώς:
- (i) Η υδροστατική πίεση στον πυθμένα του δεύτερου δοχείου σε σχέση με την πίεση στον πυθμένα του πρώτου δοχείου.
- (ii) Το μέτρο της δύναμης που θα δέχεται ο πυθμένας του δεύτερου δοχείου σε σχέση με το μέτρο της δύναμης στον πυθμένα του πρώτου δοχείου.

**ΘΕΜΑ 9 (12 μονάδες)**

**Α.** Στο διάγραμμα φαίνονται δύο στιγμιότυπα της κίνησης μιας μπάλας A που κινείται οριζόντια, προς τα δεξιά, κατά μήκος μιας ευθύγραμμης αυλακωτής τροχιάς. Ο χρόνος μεταξύ των δύο διαδοχικών στιγμιότυπων είναι ίσος με δύο δευτερόλεπτα. Το μέτρο της ταχύτητας της μπάλας αυξάνεται με το χρόνο.



**Κίνηση της μπάλας A με ταχύτητα που αυξάνεται με το χρόνο.**

**(α)** Να αντιγράψετε το πιο πάνω διάγραμμα στο τετράδιο απαντήσεών σας και σημειώστε ακόμα δύο στιγμιότυπα της μπάλας A, για κάθε 2s, έτσι ώστε να αποδίδεται ορθά η κίνησή της. Δικαιολογήστε.

**(β)** Να σχεδιάσετε στο διάγραμμά σας, στα στιγμιότυπα 1 και 2, το διάνυσμα της ταχύτητας της μπάλας A  $\vec{u}_1$  και  $\vec{u}_2$  αντίστοιχα.

**(γ)** Να σχεδιάσετε στο διάγραμμά σας, στο στιγμιότυπο 3, το διάνυσμα της επιτάχυνσης της μπάλας A,  $\vec{a}$ . Δικαιολογήστε.


**(δ)** Δεδομένου ότι το μέτρο της ταχύτητας της μπάλας A αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, να χαράξετε ποιοτικά τη γραφική παράσταση της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στην μπάλα σε συνάρτηση με το χρόνο για την πιο πάνω κίνηση.

**(Β)** Μια δεύτερη μπάλα B κινείται οριζόντια, προς τα δεξιά, κατά μήκος μιας ευθύγραμμης αυλακωτής τροχιάς, έτσι ώστε το μέτρο της ταχύτητας της μπάλας B να ελαττώνεται με το χρόνο.

**(ε)** Να σχεδιάσετε, σε νέο διάγραμμα, τέσσερα διαδοχικά στιγμιότυπα της μπάλας B, ανά δύο δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να αποδίδεται ορθά η κίνησή της. Δικαιολογήστε.

**ΘΕΜΑ 10 (15 μονάδες)**


**Α.** Στο Σχ.1 η σιδερένια σφαίρα βρίσκεται σε ισορροπία με το νήμα κατακόρυφο. Ο μαγνήτης κρατείται ακίνητος σε απόσταση d από τη σφαίρα.



**(α)** Να αντιγράψετε το Σχ.1 στο τετράδιο απαντήσεών σας και σχεδιάστε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στη σιδερένια σφαίρα. Σε παρένθεση, δίπλα από κάθε δύναμη, να γράψετε το σώμα που την ασκεί.

**(β)** Το βάρος της σφαίρας έχει μέτρο 4N. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί ο μαγνήτης στη σφαίρα είναι 3N. Να υπολογίσετε την τάση του νήματος.

**Β.** Στο Σχ.2 η ίδια σιδερένια σφαίρα βρίσκεται και πάλι σε ισορροπία, με το νήμα να αποκλίνει από την κατακόρυφο, εξαιτίας της νέας θέσης του μαγνήτη. Ο μαγνήτης κρατείται και πάλι ακίνητος στην ίδια ακριβώς απόσταση d από τη σφαίρα, όπως ήταν στο Σχ.1.





**(α)** Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης του νήματος, στο Σχ.2.

**(β)** Μετακινούμε το μαγνήτη οριζόντια σε μεγαλύτερη απόσταση από τη σφαίρα (μεγαλύτερη από d). Κρατάμε και πάλι

ακίνητο το μαγνήτη και η σφαίρα ισορροπεί σε νέα θέση. Να εξηγήσετε κατά πόσο η τάση του νήματος θα μείνει η ίδια, θα ελαττωθεί ή θα αυξηθεί, σε σχέση με την προηγούμενη τιμή.

**ΘΕΜΑ 11 (20 μονάδες)**

Ένα σώμα  $\Sigma_1$ , σταθερής πυκνότητας, με σχήμα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, βρίσκεται κρεμασμένο από το άγκιστρο ενός δυναμόμετρου. Το σώμα βυθίζεται αργά-αργά σε δοχείο που περιέχει υγρό. Το δοχείο με το υγρό βρίσκεται πάνω σε ζυγό. Η γραφική παράσταση δείχνει την ένδειξη του δυναμόμετρου σε σχέση με την απόσταση  $x$  μεταξύ της κάτω επιφάνειας του σώματος και της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού, όπως δείχνει το σχήμα. (Δίνεται:  $g=10\text{m/s}^2$ )



- (α) Να εξηγήσετε ποιο είναι το πραγματικό βάρος του σώματος  $\Sigma_1$ .  
 (β) Να υπολογίσετε την άνωση που δέχεται το σώμα  $\Sigma_1$  όταν βρίσκεται ολόκληρο βυθισμένο στο υγρό.  
 (γ) Δίνεται ότι το βάρος του δοχείου μαζί με το υγρό είναι  $50\text{N}$ . Να εξηγήσετε ποια είναι η ένδειξη του ζυγού όταν το σώμα βρίσκεται ολόκληρο βυθισμένο στο υγρό.  
 (δ) Δίνεται ότι η βάση του σώματος  $\Sigma_1$  έχει εμβαδόν  $40\text{cm}^2$ .  
 Να υπολογίσετε: (i) Την πυκνότητα του σώματος  $\Sigma_1$  και (ii) Την πυκνότητα του υγρού.  
 (ε) Μεγάλο ποσοστό μαθητών ισχυρίζονται ότι η άνωση που δέχεται ένα σώμα που βυθίζεται σε υγρό εξαρτάται από το βάθος στο οποίο βυθίζεται.  
 Να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από το πιο πάνω πείραμα για να δείξετε ότι η άποψη αυτή των μαθητών είναι λανθασμένη.  
 (στ) Επαναλαμβάνουμε το πιο πάνω πείραμα, με το ίδιο υγρό, με ένα δεύτερο σώμα  $\Sigma_2$  το οποίο έχει ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις (εμβαδό βάσης και ύψος) με το σώμα  $\Sigma_1$ . Το σώμα  $\Sigma_2$  έχει διπλάσιο βάρος από το βάρος του σώματος  $\Sigma_1$ . Να χαράξετε, σε βαθμολογημένους άξονες, τη γραφική παράσταση της ένδειξης  $F$  του δυναμόμετρου σε σχέση με την απόσταση  $x$  μεταξύ της κάτω επιφάνειας του σώματος  $\Sigma_2$  και της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού, για  $0 \leq x \leq 10\text{cm}$ . Δικαιολογήστε.